

كيفية جمع عينة البراز للقيام باختبار الزراعة و التحضين

- قم بجمع العينات في سطح جاف و نظيف (على سبيل المثال استعمال نونية أو ورقة جريدة أو كرتونة مطوية أو كيس من البلاستيك يقع وضعه على سلة أو أسفل غطاء التواليت).
- هام : لا يجب أن يكون البراز مختلطاً لا بالبول و لا بماء التواليت.
- يجب أخذ العينات من أماكن مختلفة من الغائط.
- قم بوضع العينة في وعاء من البلاستيك مع سدادة ملولبة يقع توفيره من المعمل أو يقع شراؤه من الصيدلية. عينة البراز تكون مساوية في حجم جوزة الهند؛ إذا كان البراز غير متماسك أو في شكل إسهال، قم بجمع بين 5 و 10 مل من البراز على الأقل.
- قم بغلق الحاوية جيداً و احملها في أسرع وقت ممكن إلى شبّاك إستقبال العينات أو إلى المعمل؛ إذا كان البراز سائلاً يجب إيصاله إلى المختبر في مدة زمنية تتراوح بين 30 و 60 دقيقة من وقت الجمع.
- في حال كانت هناك حاجة لأكثر من عينة، قم بجمع البراز في أيام متعاقبة (يوم نعم و يوم لا) إلى حدود 3 أيام بعد ذلك قم بتسليم كل عينة على حدة في أقرب وقت ممكن إلى شبّاك استقبال العينات أو إلى المختبر.

MD19 Rev. N° 03	REDATTO DA	APPROVATO DA
Data di emissione:		