


CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
E CONTESTUALE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAME PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE

Trento, 28 giugno 2024

PROVA SCRITTA N. 2

1.	La signora Anna, contatta l'infermiera del territorio e la informa che da alcuni giorni presenta dispnea quando sale le scale, è aumentata di circa 3 kg, ha le caviglie gonfie e urina meno del solito. Quale problematica sospetti? a) scompenso glicemico b) encefalopatia epatica c) scompenso cardiaco d) sepsi
2.	Alessandra, una ragazza di 18 anni, è ricoverata in medicina per diabete mellito di tipo 1 di nuova insorgenza. L'infermiere deve valutare il raggiungimento degli obiettivi educativi, quale affermazione corretta darà la paziente in merito alla gestione dell'ipoglicemia secondo la "regola dei 15"? a) assumo 30 g di glucosio, rivaluto la glicemia dopo 30 minuti e ripeto il trattamento con altri 30 g di glucosio nel caso in cui la glicemia non risulti superiore a 110 mg/dl b) assumo 15 g di glucosio, rivaluto la glicemia dopo 60 minuti e ripeto il trattamento con altri 15 g di glucosio nel caso in cui la glicemia non risulti superiore a 110 mg/dl c) assumo 15 g di glucosio, rivaluto la glicemia dopo 15 minuti e ripeto il trattamento con altri 15 g di glucosio nel caso in cui la glicemia non risulti superiore a 100 mg/dl d) assumo 30 g di glucosio, rivaluto la glicemia dopo 45 minuti e ripeto il trattamento con altri 30 g di glucosio nel caso in cui la glicemia non risulti superiore a 100 mg/dl
3.	Come si comporta un paziente affetto da eminegligenza destra? a) presenta un'alterazione nella comprensione ed espressione delle parole b) non vede e non riconosce gli oggetti e le persone poste a destra c) non è in grado di articolare le parole in maniera normale d) non osserva e riconosce gli oggetti e le persone poste a sinistra
4.	Nel reparto di Geriatria il Signor Luigi presenta scariche diarroiche, dalla coprocultura è risultato positivo al Clostridium Difficile, quali interventi metti in atto? a) se possibile spostato il paziente in stanza singola, segnalo la necessità di adottare le precauzioni standard, istruisco i caregiver in particolare al lavaggio mani con acqua e sapone b) se possibile spostato il paziente in stanza singola, segnalo la necessità di adottare le precauzioni da contatto, istruisco i caregiver in particolare al lavaggio mani con acqua e sapone c) se possibile spostato il paziente in stanza singola, segnalo la necessità di adottare le precauzioni standard, non è necessario istruire i caregiver d) se possibile spostato il paziente in stanza singola, segnalo la necessità di adottare le precauzioni da contatto, vieto le visite ai famigliari
5.	In un paziente affetto da cirrosi epatica l'assunzione del lattulosio: a) riduce il pH intestinale senza modificare la flora batterica, non possiede effetto lassativo b) aumenta il pH intestinale, modifica la flora batterica da putrefattiva in fermentativa, non possiede effetto lassativo c) riduce il pH intestinale, modifica la flora batterica da putrefattiva in fermentativa, ha effetto lassativo d) aumenta il pH intestinale, senza modificare la flora batterica, ha effetto lassativo
6.	Cosa indica la <i>perspiratio insensibilis</i> nel calcolo del bilancio idrico? a) acqua introdotta con il respiro e proveniente dalle molecole di H₂O contenute nell'aria b) acqua autogenerata dalle cellule epiteliali e che aumenta con il rialzo termico c) acqua che si perde inconsapevolmente attraverso la cute e la respirazione d) acqua che si produce a livello gastrico e intestinale e che si perde attraverso le feci

7.	Quale delle seguenti tecniche relazionali è più appropriata nei confronti di pazienti aggressivi? a) adottare una relazione simmetrica b) rispondere con tono deciso e autoritario c) mostrare attenzione ed apertura e tono di voce pacato d) dire al paziente ciò che deve o non deve fare
8.	Marco, un signore di 86 anni è ricoverato in Geriatria per bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) riacutizzata, quali interventi metti in atto? a) mantenere il paziente in posizione semi Fowler per facilitare l'espansione polmonare, somministrare ossigeno ad alti flussi con l'obiettivo di mantenere una SpO₂ non inferiore al 96% b) mantenere il paziente in posizione supina per facilitare il ritorno venoso, somministrare ossigeno a bassi flussi con l'obiettivo di mantenere una SpO₂ nel range 88-92% c) mantenere il paziente in posizione semi Fowler per facilitare l'espansione polmonare, somministrare ossigeno a bassi flussi con l'obiettivo di mantenere una SpO₂ superiore al 98% d) mantenere il paziente in posizione semi Fowler per facilitare l'espansione polmonare, somministrare ossigeno a bassi flussi con l'obiettivo di mantenere una SpO₂ nel range 88-92%
9.	L'emissione di feci molto liquide, fino anche 2 litri al giorno, ricche di elettroliti ed enzimi digestivi è una caratteristica tipica di: a) colostomia in fase di stabilizzazione b) ileostomia nell'immediato post operatorio c) ileostomia in fase di stabilizzazione d) colostomia nell'immediato post operatorio
10.	Il sig. Vittorio è stato operato di intervento di chirurgia addominale maggiore; quattro ore dopo l'intervento si presenta pallido, sudato e confuso. Alla rilevazione dei parametri vitali presenta frequenza cardiaca 130 battiti/min, pressione arteriosa 90/60 mmHg. In questa situazione ipotizzo: a) un regolare decorso post operatorio b) solo uno stato di agitazione e confusione c) una emorragia post operatoria d) la presenza di dolore
11.	Maria, 78 anni, è ricoverata in Medicina per scompenso cardiaco in cardiomiopatia dilatativa con frazione di eiezione del 28%. Oltre alla valutazione del peso e la dispnea quali altri aspetti monitoreresti? a) glicemia, colorito cutaneo, comparsa di edemi declivi b) valore dell'ammonio, presenza di edemi declivi, stato del cavo orale c) valore dei globuli bianchi e formula leucocitaria, colorito cutaneo, presenza di edemi declivi d) bilancio idrico, colorito cutaneo e presenza di edemi declivi
12.	Le fiale di Sodio Bicarbonato da 10ml hanno la seguente concentrazione: 1 mEq/ml. Definire il numero di fiale necessarie per somministrare 35 mEq. a) 2 b) 2+1/2 c) 3 d) 3+1/2
13.	Nel reparto di Medicina Interna il Signor Gianfranco, a cui è stata recentemente modificata la terapia, riferisce tosse secca. Quali fra i seguenti farmaci assunti possono causare la sintomatologia riferita? a) Bisoprololo b) Lansoprazolo c) Ramipril d) Quetiapina



14.	Il Sig. Mario mentre sta mangiando presenta improvvisamente sintomi da soffocamento. Pur avendo incoraggiato il paziente a tossire, la tosse diventa inefficace, come è corretto procedere? a) fai chinare la vittima in avanti, percuoti tra le scapole con il palmo della mano (5 colpi dorsali) b) inviti il paziente a bere e poi percuoti tra le scapole con il palmo della mano (8 colpi dorsali) c) fai chinare la vittima in avanti, percuoti tra le scapole con la mano chiusa a pugno (5 colpi dorsali) d) posizioni il paziente in posizione laterale di sicurezza, percuoti tra le scapole con il palmo della mano (5 colpi dorsali)
15.	La tendenza di alcuni malati di Alzheimer di spostare continuamente oggetti o di nasconderli senza una finalità precisa è definita : a) discalculia b) agnosia c) aprassia d) affaccendamento
16.	Una persona con Morbo di Parkinson manifesta bradicinesia quando : a) presenta un rallentamento nei movimenti e/o una difficoltà nell'eseguire movimenti fini b) manifesta episodi sincopali dovuti a bradicardia c) presenta tremori agli arti sia a riposo che sotto sforzo d) presenta un deficit di memoria a breve termine
17.	Per prevenire l'insorgenza di lesioni da pressione, quali tra le seguenti indicazioni sono raccomandate dalle linee guide NPUAA/EPUAP/PPPIA (2019) a) mantenere la cute pulita e asciutta e applicare con massaggio prodotti antisettici b) mantenere la cute pulita e asciutta e applicare quotidianamente medicazioni a base di argento c) detergere la cute con prodotti su base alcalina e applicare quotidianamente medicazioni in idrofibra d) mantenere la cute pulita e asciutta ed evitare manovre che provocano frizione
18.	Quale delle seguenti scale utilizzi per misurare il dolore in un utente adulto con compromissione cognitiva: a) BRADEN b) BRASS c) PAINAD d) NEWS
19.	Quale attività è prevista dal Profilo dell'Operatore Socio Sanitario (OSS - Accordo stato regioni 2001)? a) somministrazione nutrizione enterale b) esecuzione clisma con sonda c) interventi di comfort, igiene e sicurezza degli ambienti d) esecuzione prelievo venoso
20.	Secondo la "Raccomandazione per la prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità AB0" (2020), per evitare che il sangue sia trasfuso alla persona sbagliata, l'identificazione del ricevente va effettuata: a) al letto del paziente individualmente da due operatori sanitari immediatamente prima dell'inizio della trasfusione; b) da un operatore sanitario in caso di paziente vigile e da due operatori sanitari in caso di paziente non vigile c) da un unico operatore sanitario chiedendo al paziente stesso di declinare i propri dati anagrafici confrontandoli con quelli indicati sul braccialetto identificativo d) unicamente dal medico che ha in cura il paziente

